

23 avril
1758.

BB

Memoire par lequel on tâche de faire voir la
manière de guerir radicalement les hernies des
âmes qui arrivent aux jeunes personnes, de l'un et
de l'autre sexe, par l'application du bandage épica.

Les hernies ou descentes inguinales ne sont que trop communes
aux adultes; et quoi qu'on fasse de ces infirmités soient
bien fournies, les moyens dont on s'est servi jusqu'à présent
pour en procurer la guérison, ont été inutiles. un nombre

(a) Fabricius hist. de quibus
en fite un exemple.

En 1750, une personne
attaquée de fièvre tierce
me consulta sur une
hernie qui lui étoit
survenue depuis sa

fièvre. J'examinai cette
maladie, et je trouvai
qu'elle en avoit une
de chaque côté. Je lui

fis promptement un
bandage elastique
et double, qui je lui

couvrisse de temps en
temps ni nuit ni jour,
pendant quelques mois,

ce qu'elle a fait, et s'est
trouvée par fait guérie
après six mois

de cet usage. depuis quelle
est retournée, elle a repris
ses exercices ord.^{rs} sans

s'être appesantie de cette
incommode, et quoi
qu'elle ait abandonné
son bandage peu de
temps après les six
mois révolus, et qu'elle
ait été âgée de 48 ans

d'hommes de différentes professions, ont essayé plusieurs
secrets à ce dessein; mais aucun n'a pu arriver à ce but

si désiré de l'art et de ceux qui en sont incommodés. de
sorte que sur ce point on n'est pas plus avancé à présent

qu'on l'étoit du temps du père de Fabricius et autres
qui se l'ont essayé et succédé, qui se sont donnés au

public pour des guérisseurs de cette sorte de maladie:
et s'il s'est trouvé quelques adultes (a) qui aient

guéris de ce mal, ils se l'ont été moi-même par les secours
de la chirurgie, que par leurs propres facultés, à

l'aide de quelques courtaines étrangères à cette vue.

Les nouveaux nés et les adolescents ne sont pas plus
exempts de ces infirmités, que ceux qui succèdent à ces

deux âges: mais comme leurs accoucheurs, ou les
différents procédés de la chirurgie, peuvent rétablir le

relâchement des parties qui servent d'appui aux organes
du bas-ventre qui forment ces sortes de tumeurs, ces

indispositions peuvent se traiter et se guérir chez eux, ce
que l'expérience de presque tous les temps a confirmé

d'une façon non-équivoque: j'en n'ai même trouvé

qui ont guéri sans le secours de l'art; il est vrai que les
tumeurs hémiaires de ceux qui ont éprouvé une guérison
si heureuse, annoncent par leur petit volume, fort
peu de dilatation et de relâchement aux anneaux et
au péritoine, circonstances très favorables pour parvenir
à une guérison prompte et assurée dans ces jeunes sujets.

En général les causes efficaces de ces tumeurs
similitudinaires et fontanaires, sont internes et externes,
dans tous les âges où elles peuvent être produites.

Les causes internes sont, en premier lieu, les parties
elles-mêmes qui les forment par leur poids, telles que les
intestins, l'épiploon; et fort souvent ces organes sont
accompagnés, dans leur déplacement, d'une sérosité fort
abondante et fort relâchée, qui part ordinairement
des glandes des aînes, de celles du péritoine et des intestins; aussi fort
souvent provient de dissolution du sang, d'obstruction des
glandes mésentériques, &c. produite par presque toutes les
indispositions, et les maladies qui attaquent particulièrement
les enfans. Cette eau aide beaucoup à relâcher les anneaux
et leur texture, ainsi que le péritoine, en inondant et en
imprégnant ces parties, de manière à ne pouvoir s'opposer,
par leur inertie, aux impressions réitérées de l'épiploon
et des intestins, que leur propre poids d'ailleurs détermine
à se porter vers ces endroits. on peut ajouter à ces causes
d'usage nécessaire que font les enfans des aliments gras,
onctueux, et humectans, et de certains exercices par leur
état; les premiers violents médiatement et immédiatement

des muscles érigatoires et ceux de la respiration, produites
par ^{des} mouvements violens, les vomissemens, la toux vive
et longue, la coqueluche, lesroidis de fardemens, les
grasseurs, les accouchemens, surtout les accouchemens
laborieux, le chauf, les frus, &c.

Suondement, les fautes extérieures et primitives sont, les
chutes rudes et precipitées faites principalement du côté
du ventre, les coups portés aux circonferences de
cette capacité, les éblouissures, d'habitation des climats
aquatiques, &c.

Comme j'ai fait mention plus haut que ces infirmités
étoient quérissables aux enfans, jusqu'à un âge assez
avancé, je serois avois trouvé un moyen sûr à cette fin.
il y a fort longtemps que je différois à le communiquer
à l'académie; mais si j'ai été jusqu'à present à lui en faire
part, c'est sous les différentes manœuvres que j'ai été obligé de
faire pour lui donner quelque perfection, avant de lui
présenter. cependant malgré mon attention et ma
vigilance à lui procurer ce caractère, si elle lui trouvoit
quelques défauts, et qu'elle décide néanmoins qu'il soit
de quelque utilité, elle corrigera mieux qu'personne les
imperfections: ainsi mon intention en lui adressant
aujourd'hui, n'a point d'autre but que celui-ci, afin qu'il
devienne entre ses mains plus avantageux au public, et
soit de chirurgien en le publiant, si elle l'en juge
digne.

C'est un bandage qui, par son application méthodique,
quoique quelque fois on soit obligé de s'écarter de la



regle générale pour des causes imprévues, guérit
complètement et sans retour les hernies des aînés des
enfants, à commencer depuis l'âge et le temps de leur
propreté, lequel est indéterminé, jusqu'à celui de quinze
et même vingt ans.

Le bandage a cela encore d'avantageux, qu'il est
connu des chirurgiens, par l'usage duquel ils sont
de s'en servir pour toutes autres maladies des aînés qui
peuvent avoir besoin d'une pression un peu ferme et
exacte, et qu'on simple annoncé, avec quelques légères
différences, qui se trouvent dans celui que je propose,
peuvent les en instruire en ce qu'il a de particulier.

C'est de l'épica de l'aîné que j'en devrais joindre ici,
à cause des raisons déjà dites, avec quelques additions de peu
de chose, dont l'application, ainsi que je le ferai voir
bientôt, opère ce rétablissement.

(a) v. sou trait.

Opérations, 2^e édi. de
1740, pag. 323.

M. Dionis parle d'un pareil bandage (a) pour la
même cure, mais qui diffère du mien par les foulons
et l'emplâtre dont il fait usage, dans la place de
quel je substitue une pelote triangulaire, et que la
bande qu'il emploie à faire son appareil, est de
moitié moins longue que celle dont j'en use.

J'en suis par moi-même d'accord avec lui dans une chose
qui me paraît fort essentielle: il conseille de mettre
ce bandage aux enfants qui sont même à la mamelle.
« Ces bandages, dit-il, (b) quoi que simples, guérissent
souvent les enfants; mais quand ils sont à la mamelle,

(b) ibid. pag. 327.

= ou qu'ils ne sont pas encore nets, il faut leur en changer
= tous les jours: &c.

(a) j'ai trouvé bien
de bonnes femmes,
et même des
Chirurgiens, qui ont
tenus, à l'exemple
de M. Dionis, le
procédé, sans aucune
diarrhée, et qui n'ont
acquis par cette
manière, que la
malheureuse
expérience, que ce
sacris à cet âge,
est inutile, et souvent
très dangereux.

L'expérience m'a appris que cet auteur a avancé ce
ci un peu trop légèrement et sans en approfondir les
suites, par des preuves et par la réflexion (a). Premièrement,
dans le principe peut-on penser que les parties d'un enfant
qui ne font que de naître, et dont l'accroissement dans
ces premiers jours de la vie est presque inflexible, peuvent
recouvrer cet organe que j'ordonne ou suffoquer par les
différentes causes qui produisent cette maladie, en
appliquant et réappliquant presque continuellement ce
bandage si comprimeur, que le moindre frot et le moindre
mouvement peuvent déranger?

mais, me pourroit-on objecter: Si on ne remédie pas
auvintôt qu'on s'est aperçu de ce tort, aux enfans, cette
négligence peut leur devenir funeste; ainsi le délai que l'on
prend est plus dangereux que l'application de ce bandage
dès les premiers jours de leur vie; d'ailleurs même ils en
guérissent plus sûrement et plus tôt. J'en vais par, et n'en ai
même aucun exemple, de danger que peuvent fournir ces
enfans indifférents, comme j'ai dit, l'application de ce
bandage, jusqu'au temps de leur guérison; car j'en n'ai
renvoyé un assez bon nombre à ce temps, dans lesquels
leur soient arrivé aucun accident: j'en n'ai même à
présent dans ce cas qui se portent fort bien. il est vrai
qu'il faut recommander aux nourrices de faire



reutres ~~des~~ Les parties sorties chaque fois qu'elles se
changent de l'ange, ce qui est fort facile; quand on fait
outre à montre, vous sçavez qu'elles ayent de l'intelligence.

Il y a plus: certainement il est constant que quelque
bien appliqué que puisse être ce bandage inguinal
des d'aussi faibles en fait, il ne peut qu'être très
préjudiciable, par la continuelle compression qu'il doit
faire sur les parties où il se trouve posé, pour faire
l'effet qu'on doit avoir lieu d'attendre d'une pareille
application. mais pourriez-vous encore dire, il n'y a qu'à
le servir d'une manière qu'il ne gêne point ou même fort
peu, par cette pression ou adhésive au lieu d'être
quel'on prétend s'y trouver. d'accord; mais si ce bandage
ne sert pas avec vous à tenir les organes toujours joints
adossés au moindre mouvement de l'enfant, que ces
parties sortent totalement ou en partie, que ce bandage
les serre et les déprime, par leur chute, peut leur
devenir nuisible, par ce qu'il peut pincer et faire
contusion à l'intestin et à l'épiploon, jusqu'à y attirer
inflammation et gangrène, comme je l'ai vu arriver
dans un semblable cas, ou occasionner une adhérence de
ces organes, avec le sac herniaire, fruit de l'inflammation,
qui pourroit rendre cette maladie incurable à tout
moien. en outre si ce bandage ne sert pas avec, les
inconveniens dont on vient de parler à part, vous
maintenez les parties de la tumeur dans le ventre,
pourquoi l'applique-t-on? il est donc tout au moins

4
inutile, ainsi que les veines que l'on greffe, et que l'on
fait ossifier, par cette application grasse et hon de saifon
en effet en différentes applications et réapplications
ne font que tourmenter ces tendres Sujets, et les indifferer
naturellement, par ce tracas si souvent réitéré: car tout cela
ne peut point de faire d'au frais et d'au pleurs, ce qui est
très contraire encore à l'état de ces innocentes victimes.
Je suppose même que ce bandage n'a^{it} pas ces défauts,
et qu'il n'aurait que celui qui oblige de le lever si souvent,
à cause de la mal-propreté; il serait bien plus que
suffisant pour le faire bannir de la saine pratique,
étant très clair qu'il ne doit, et ne peut même opérer de
bons effets, qu'autant qu'il maintient d'au interruption
d'au leur lieu naturel, les parties qui pourroient à
former la descente, par leur déplacement. Les artères et
veines, la sortie et la rentrée d'au organes, tiennent
toujours les uns d'au la dilatation, la quelle et
~~ne peut être distendue~~ ces parties ne peuvent être
ritables de ce vice, qui empêcheant l'au de ces
organes en ces innies contre-nature. J'ajouterois encore
qu'ou au fait étant toujours plein de ses excremens,
doit salir et gâter nécessairement ce bandage, plusieurs
fois d'au sejour et d'au la nuit, de sorte que si l'on
veut le^{le} tenir propre, comme cela doit être, il faudra
doue lui changer autant de fois de bandage que de
longe, si l'on veut prévenir le prurit, l'irritation,
et même l'inflammation, aux parties, sur les quelles
s'appliqueroient ces bandages imbus de ses fèces: quel
embarras pour les nourrices et pour les sages-femmes!



quelles fatigues, quels dangers, et quelles douleurs à quoi on
expose en en faisant.

on dira, peut-être, avec quelque raison de vrai-semblance,
que c'est le passage de M. Dionis qui je viens de visiter et
de son batte en requ'il a de défautueux, qui m'a donné
l'idée de ce bandage. Je puis assurer ici d'un
désaveu positif, que j'ignorais ce point de pratique d'un
cet auteur, ainsi qu'en tout autre, avant ma découverte;
et je n'y ai fait attention depuis que par l'affinité
que j'ai trouvée de ce bandage au mien, en lisant son
traité d'opération depuis que M. de lafaye l'a
enrichi de notes très judicieuses. D'ailleurs j'ai vu
cet auteur tout de respect et la confiance que
m'inspire son rare mérite. Si je devois à ce grand-
homme cette idée, je me ferois un honneur de le
donner ici pour mon maître en ce point comme
il l'est certainement en tous autres: mais quelque
jeu important ~~que~~ soit le sujet de ce mémoire,
s'il y en avait de ce genre en chirurgie, je suis
toujours charmé de faire connaître mon dévouement
pour la perfection d'une profession que j'aime
uniquement, et d'annoncer le peu qui est de moi. Je
reviens à mon sujet.

on ne doit mettre ce bandage qu'à ceux enfans bien
conformés, en parfaite santé, et exempts de toutes
les indigestions et les maladies qui les affligent
ordinairement, dans ces premiers âges; car autrement on ne
pourrait pas s'en assurer une heureuse réunion, sans

5
les circonstances a l'égard du temps.

La saison qui se croit la plus propre pour
cette opération est celle de l'hiver, par laquelle en fau-
rent plus volontiers audit d'au, cette âpre saison.
Le froid y est même contribuer à renover le sang,
et à aider par ce double secours aux vûes générales
de cette cure.

Si l'enfant suole quel on se propose d'appliquer
ce bandage, est d'un âge un peu avancé, on fera fort
bien de le préparer à cette opération, par quelques
saignées, et par quelques purgations appropriées: et
tout pendant le temps qu'il portera ce bandage, on lui
fera observer un régime de vivre un peu sec et
astringent, ce qui l'opérera aussi aux enfans, les
plus jeunes qui seront dans ces cas.

on leur fera aussi observer beaucoup de
sobriété suole, choses non-naturelles qui leur
seront permises; et leur régime de vie sera plus
multiplier que la l'ordinaire: par cette attention
on évitera des indispositions qui pourroient
s'opposer au dessein que l'on se propose d'au
cette attention, qui n'est pas de petite considération.

il ne sera pas hors de propos d'avertir ici les
jeunes chirurgiens qu'ils ne se trompent pas, en prenant
des hydrocles pour des hernies, lors qu'ils seront
appelés pour traiter de pareilles indispositions; par
ce que fort souvent les enfans nouveaux nés ont cette
maladie première maladie: il y en a même



qui naissent avec elle; mais on les distingue l'une
de l'autre, en ce que l'hydraule ne disparaît point,
quelque chose qu'on fasse pour la dissiper; et la
descente au contraire sent le poule peu qu'on la
gronde, lors que surtout l'enfant est couché.

Si le sujet de ce mémoire me permettoit de faire ici
quelques réflexions sur les hydraules qui arrivent aux
enfants naissants, je pourrais toucher cette matière le plus
sûrement qu'il seroit possible; mais comme je m'appréhends
qu'elle exigeroit une trop longue discussion, et que je prévois
que ce discours ne le sera déjà que trop, je renvoie ce
projet à un autre temps, étant la matière d'un mémoire
raisonnable, et dans lequel il y aura beaucoup de
travail, et qui exigera une ample narration; car jusqu'à
présent aucun auteur, que je sache, n'a écrit particulièrement
sur cette importante doctrine. Les réflexions qui m'ont
fait faire les différents traitemens de ces incommodités, me
donneront lieu d'y ajouter les procédés que j'ai tenus avec
quelques succès, et les découvertes que j'ai fait dans ce genre
d'affection contre nature.

à prouver que j'ai suffisamment déduit des fautes de ces
maladies, autant que mes lumières m'ont permis, et de leurs
circonstances accessoires, pour parvenir avec guérison
radicale; il est temps de parler du moyen principal, le
vieux dire de l'appareil, en quoi il consiste, et de son
application.

Cet appareil consiste donc, 1.^o en une bande de huit à
neuf aunes de long, plus ou moins large selon la
grandeur du malade: 2.^o d'une pelote triangulaire faite

de charpie osseuse, ou paverse de linge usé, médiocrement
fin, et un peu mollette, de la grosseur d'une bale d'épauve
ordinaire, qui cependant doit différer en grosseur, selon
l'âge du sujet et de la nature de la dilatation des osseaux:
3.^o dans un médicament composé d'eau de chaux, de
quelques gouttes d'esprit de sel, d'une pincée de blanc d'œuf bien
battu avec cela, dans laquelle on aura fait dissoudre
avant gras d'alun comme une petite noisette; 4.^o enfin, en
une grosse éguille enfilée de deux brins de fil ciré et
bien blanchis.

Toutes ces choses faites, on fera uriner l'enfant, ou le
coûchera horizontalement le dos appuyé sur les genoux
d'une personne ferme et qu'il connaît: le genou sous
lequel seront ses jambes, sera beaucoup plus élevé que
l'autre, de sorte que sa poitrine sera bien plus basse
que son bassin; et l'on fera soutenir ses jambes par
une seconde personne, qui aura soin de les ~~tenir~~ écarter
lors qu'il en sera nécessaire. après ces précautions prises,
on fera exactement rentrer dans l'abdomen les intestins
déplacés, si ils sont sortis, avec le talon de la main
est possible, ensuite on appliquera au pli de l'aîne et
sur le trou de la dilatation, la pelote dont on a parlé,
parfaitement imbibée du médicament dont il a été
question, de manière que l'espace qui se trouvera entre
les deux angles les plus distans de cette pelote, touchera
immédiatement au pli de l'aîne; après quoi on procédera
à l'application de la bande, de façon qu'elle, les tours qui
doivent former l'épi, garniront tous également les
différens points antérieurs de la pelote; et à chaque



circulation ou amputera autour la pelote, garde,
joint d'aiguille, afin de la rendre pour ainsi dire —
immobile dans la place assignée; circonstance de la
quelle dépend la réussite de l'opération; ce qu'on fera
aussi autour des endroits de la flexion de la main ou des
circulaires qui ont de la douleur, en les intéressant tous par les
jointes ou par une suture exacte: et aussi pour prévenir
qu'il n'y ait aucune inflammation de la peau, ne faut pas
bourrer, qui pourroit envenimer ou lecher les parties
sur lesquelles il se trouveroit. La précaution de faire
en différents tours de bande, dans tous les endroits où il
peut y avoir de la douleur, surtout où se trouvent les —
fractures, empêche aussi ce bandage de tourner autour
du corps, à mesure qu'il se détache, quelques précautions
qu'on n'ait prises d'ailleurs, dans son application, par les
mouvements perpétuels qu'il donne ordinairement les
enfants: c'est aussi de leur engager à le serrer un peu
ferme d'abord; et l'on doit même veiller à le renouer de
temps en temps, à mesure qu'il se détache, par de petits
replis ou pinces, dans lesquelles il est nécessaire d'y —
comprendre tous les tours de la bande, afin qu'ils soient
tenus également partout: mais il ne faut faire ces
replis que sur les parties les plus charnues, et les
moins susceptibles de dépression et de meurtrissure.

et pour procurer à ces enfants ainsi bandés la facilité
de supporter ce bandage avec moins de gêne et plus —
patience; et faciliter aussi la circulation du sang qui
pourroit être troublée d'abord un peu par la compression
que fait ce bandage sur des vaisseaux voisins, il faut
leur faire tenir le lit pendant quelques semaines; mais

ou se réglera à ce sujet deux heures ou moins de temps qu'il
doit rester couché, par heures ou moins de dilatation
des anneaux, la douceur de la douleur ou indolence à rester
tranquille: on fera en sorte qu'il s'ennuie à plat, et même
les fesses plus élevées que la poitrine: on aura aussi
attention de lui faire donner des frictions pour prévenir
la constipation qui deviendrait fort contraire à une
guérison sûre si elle venait avoir certain point.

S'il se trouvait par hasard de ces enfans qui eussent
une hernie aux deux aînes, on fera le même appareil pour
chaque en particulier, et alors on ne se servira que d'une
seule bande de quinze aunes de longueur ou environ, avec
laquelle on fera un double spica sur l'une et l'autre
pelote alternativement, ce qui est assez facile à faire
pour le peu qu'un chirurgien sait se faire dans la pratique
de ce bandage.

Si tout est appareil mis et d'usage point, ou quoi
qu'il se soit d'usage ou ait eu l'attention de le recommander
dans ce qu'il a d'essentiel, on le laissera cinq à six mois,
et même plus longtemps, et tant qu'on s'y jugera
nécessaire, par l'état de la santé ou d'indisposition, ou
de travail ou de l'enfant, dans cette espace de temps.

Cependant si la pelote se trouvait totalement hors
de sa place, et que ce déplacement eût donné moyen à
l'intestin de tomber dans l'aîne, ou que la bande se fût
trop relâchée, de manière à ne pouvoir plus presser
exactement cette pelote, alors il faudrait lever cet
appareil pour se réappliquer tout de nouveau, en
observant ce qui a déjà été prescrit.

J'ay traité beaucoup d'enfans, incommodes



de ce genre de maladie, qui ont guéri très
promptement avec une merveilleuse facilité,
dans le nombre des quels il y en avait même
de très avancés en âge; mais aussi j'en n'ai trouvé
d'autres à qui il a fallu un temps fort considérable,
et des précautions infinies, pour arriver à cette fin:
mais pour l'ordinaire leurs tempéraments bien
ou mal constitués, le plus ou moins de dilatabilité
de leurs aumaux comme j'en ai déjà dit ailleurs, leurs
états vegetatifs et éarochimes, étoient les
causes de ces variations.

J'ajouterais pour dernière réflexion que les
enfants de la campagne et des paysans, sont
infirmités plutôt et plus faciles à guérir de ces
bonnes que ceux des villes, quoi qu'ils soient
bien moins tenus que ces derniers, et par
conséquent plus en liberté de se déplacer,
et souvent forcés de leur plus tendre jeunesse
aux travaux les plus pénibles. Les aliments
trop nourissants et trop succulents dont l'on
gorgent les enfants des villes, exténuent ces
tendres créatures, et les jettent dans la cachexie
habituelle, et dans une débilité générale de

Leur garde, dont ils ne tirent que par une
 Constitution généralement bonne, mais dont
 toutes les facultés animales du corps de ces
 victimes de la stupidité et de l'ignorance de
 leurs parents, se trouvent jouant l'ordinaire
 tant qu'ils vivent. L'humanité découvrirait un
 bien d'une grande importance, si tous les états
 de la médecine trouvaient le moyen de persuader
 aux riches que la façon d'élever d'abord leurs
 enfans, leur devient meurtrière, en leur faisant
 servir des nourritures trop grasses et trop
 visqueuses, qui suffoquent le jeu de leurs petits
 et tendent vainement par la grossièreté de leurs
 motions qui ne peuvent en filer que des énormes
 pituites de leur calibre, ce qui leur attirent, même
 dès presque le berceau, une foule de fièvres
 atactes, et des fluxions du nez, aux
 oreilles, dont les abondances et opiniâtres
 suppurations, marquent assez que ces maladies
 ne sont pas guéries par la diète, et par l'usage
 des alimens tirés des végétaux. il y a lieu de
 croire qu'une obstruction presque générale, et
 qui affecte tous les organes adénologiques,



Le rachitis, et la formation des vers, peuvent
en être aussi des suites. Les fontainiers que
les gens de l'art méprisent par, peuvent régler
un chirurgien dans l'administration de ces secours
aux enfans qui se trouvent dans ce malheureux
et déplorable état, et dans cette vue il ne doit
l'employer qu'après un âge plus avancé aux
enfans des riches, afin que leur fortune aient
plus de tou, et à fin aussi de pouvoir les persuader
d'observer le régime et les médicamens qu'il
convient qu'ils usent tout pendant le temps
du traitement de cette infirmité, qui pourrait
sans ces conditions, devenir incurable, en
omettant les différens maîtres de fontaines et de
guérisseurs. Rolland, maître en chirurgie à Fontenai-
de Fontenai, Bar-potou.